

PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIAS Y RECTOSIGMOIDOSCOPIAS

El PACIENTE debe acudir media hora antes de la cita y/o procedimiento, con un acompañante mayor de edad, orden médica, o historia clínica (si la tiene), completamente en ayunas, tomar todos los medicamentos con un sorbito de agua. Se recomienda hacer este examen con sedación.

EL PACIENTE DEBE ACUDIR CON LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD EL TAPABOCAS Y SU ACOMPAÑANTE.

PREPARACIÓN NO. 3

PARA PACIENTES JÓVENES Y SIN COMPLICACIONES MÉDICAS ASOCIADAS, PACIENTES MENORES DE 55 AÑOS. PRECAUCIÓN: NO DEBE ADMINISTRARSE EN PACIENTES CON DAÑO RENAL, HEPÁTICO O INSUFICIENCIA CARDIACA.

- HACER UNA DIETA LIQUIDA 24 HORAS AL EXAMEN: Aromáticas, gelatinas (no rojas ni amarilla) Jugos disueltos en agua (no frutos rojos, mora, fresa, o guanábana) caldos sin residuos solo el consomé (no lácteos). Esta dieta la puede continuar durante la preparación con los laxantes y terminarla antes de 8 pm del día anterior.
- 2 IZINOVA. KIT SULFATO DE SODIO ANHIDRO, SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATO, SULFATO DE POTASIO -(DE DOS FRASCOS): Comenzar el día anterior al examen, a las 3pm, disolviendo cada frasco de IZINOVA en la copa que viene dentro del kit. Adicione agua hasta alcanzar el nivel de la línea demarcada. Durante los 30 a 50 minutos consuma despacio todo el contenido de la copa. Repita los mismos pasos para la preparación del segundo frasco. Debe ingerir mucho líquido (agua). Estará bien preparado, cuando vaya al baño y expulse agua transparente, después de las 8pm. Si no es así y expulsa mucha agua amarilla y residuos. Debe realizarse el paso número 3 siguiente:







- 3. APLICARSE UN ENEMA TRAVAD: (Fosfato de Soda) de 133 centímetros cúbicos, dos horas antes al examen, colocárselo intra-anal, retenerlo por 15 minutos y luego evacuar.
- 4. Nota: Para las mujeres por favor no traer las uñas de las manos pintadas.
- 5. Venir en total ayuno.

Contraindicaciones para las preparaciones descritas:

- Obstrucción Intestinal.
- Retención Gástrica.
- Perforación Intestinal.
- Megacolon Toxico.
- Abdomen agudo (peritonitis, etc.)
- Hipersensibilidad (alergia) a los componentes de las sustancias

¿Cualquier duda por favor escribanos al whatsapp?



